

Тестовые задания

НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (COVID - 19)

1.
Официальное
название
возбудителя
инфекции:

1) MERS-CoV

2) COVID-19

3) SARS-CoV-2

4) ТОРС

1.
Официальное
название
возбудителя
инфекции:

1) MERS-CoV

2) COVID-19

3) SARS-CoV-2

4) ТОРС

2.
Официальное
название
инфекции:

1) MERS-CoV

2) COVID-19

3) SARS-CoV-2

4) ТОРС

2.
Официальное
название
инфекции:

1) MERS-CoV

2) COVID-19

3) SARS-CoV-2

4) ТОРС

3.
Новый
коронавирус
относится к:

1) Alphacoronavirus

2) Betacoronavirus

3) Gammacoronavirus

4) Deltacoronavirus

3.
Новый
коронавирус
относится к:

1) Alphacoronavirus

2) Betacoronavirus

3) Gammacoronavirus

4) Deltacoronavirus

4.
Критерием
легкого
течения
заболевания
является:

1) Температура тела ниже 38,5 0С,
кашель, слабость, боли в горле

2) ЧДД более 22/мин

3) Одышка при физических
нагрузках

4) Пневмония, подтвержденная с
помощью КТ легких

4.
Критерием
легкого
течения
заболевания
является:

1) Температура тела ниже 38,5 0С,
кашель, слабость, боли в горле

2) ЧДД более 22/мин

3) Одышка при физических
нагрузках

4) Пневмония, подтвержденная с
помощью КТ легких

5.
Критерием
тяжелого
течения
заболевания
является:

1) ЧДД более 22/мин

2) Одышка при физических нагрузках

3) $SpO_2 \leq 93\%$

4) СРБ сыворотки более 10 мг/л

5.
Критерием
тяжелого
течения
заболевания
является:

1) ЧДД более 22/мин

2) Одышка при физических
нагрузках

3) $SpO_2 \leq 93\%$

4) СРБ сыворотки более 10 мг/л

6.

В диагностике
дыхательной
недостаточност
и при COVID-19
наибольшее
значение имеет:

1) уровень СРБ

2) рентгенография ОГК

3) спирометрия

4) пульсоксиметрия

6.

В диагностике
дыхательной
недостаточности
при COVID-19
наибольшее
значение имеет:

1) уровень СРБ

2) рентгенография ОГК

3) спирометрия

4) пульсоксиметрия

7.
Всем
пациентам с
подозрением
на пневмонию
рекомендуется:

1) КТ легких

2) обзорная рентгенография ОГК

3) спирометрия

4) газовый состав артериальной
крови

7.
Всем
пациентам с
подозрением
на пневмонию
рекомендуется:

1) КТ легких

2) обзорная рентгенография ОГК

3) спирометрия

4) газовый состав артериальной
крови

8.

Для
лабораторной
диагностики
COVID-19
применяется:

1) общий анализ крови

2) биохимический анализ крови

3) метод ИФА

4) метод ПЦР

8.
Для
лабораторной
диагностики
COVID-19
применяется:

1) общий анализ крови

2) биохимический анализ крови

3) метод ИФА

4) метод ПЦР

9.
Основным
видом
биоматериала
для
лабораторного
исследования
является
материал,
полученный:

1) при фибробронхоскопии
(бронхоальвеолярный лаваж)

2) при заборе мазка из
носоглотки и/или ротоглотки

3) сыворотка

4) фекалии

9.
Основным
видом
биоматериала
для
лабораторного
исследования
является
материал,
полученный:

1) при фибробронхоскопии
(бронхоальвеолярный лаваж)

2) при заборе мазка из
носоглотки и/или ротоглотки

3) сыворотка

4) фекалии

10.

К

этиотропной
терапии

относятся:

1) препараты интерферонов

2) антибиотики

3) глюкокортикостероиды

4) антикоагулянты

10.

К

этиотропной
терапии

относятся:

1) препараты интерферонов

2) антибиотики

3) глюкокортикостероиды

4) антикоагулянты

11.
Противомаларийный
препарат,
рекомендуемый для
лечения COVID-19:

1) циклоспорин

2) лопинавир

3) азитромицин

4) хлорохин

11.
Противомаларийный
препарат,
рекомендуемый для
лечения COVID-19:

1) циклоспорин

2) лопинавир

3) азитромицин

4) хлорохин

12.
Антибактериальная
терапия при
осложненных
формах инфекции:

1) цефтриаксон в/в в комбинации
с азитромицином

2) амоксициллин в комбинации с
метронидазолом

3) тетрациклин в комбинации с
кларитромицином

4) амоксициллин в комбинации с
гентамицином

12.
Антибактериальная
терапия при
осложненных
формах инфекции:

1) цефтриаксон в/в в комбинации
с азитромицином

2) амоксициллин в комбинации с
метронидазолом

3) тетрациклин в комбинации с
кларитромицином

4) амоксициллин в комбинации с
гентамицином

13.
В качестве
препарата для
специфической
профилактики
рассматривается

1) гидроксихлорохин

2) лопинавир

3) осельтамивир

4) азитромицин

13.
В качестве
препарата для
специфической
профилактики
рассматривается

1) гидроксихлорохин

2) лопинавир

3) осельтамивир

4) азитромицин

14.

Для
медикаментозной
профилактики
COVID-19 у
взрослых
ВОЗМОЖНО

1) внутримышечное введение
препаратов интерферона

2) интраназальное введение
рекомбинантного интерферона альфа

3) назначение лопинавира

4) назначение азитромицина

14.
Для
медикаментозной
профилактики
COVID-19 у
взрослых
ВОЗМОЖНО

1) внутримышечное введение
препаратов интерферона

2) интраназальное введение
рекомбинантного интерферона альфа

3) назначение лопинавира

4) назначение азитромицина

15.
К мерам
неспецифической
профилактики
не относится:

соблюдение правил личной
гигиены

использование одноразовых
медицинских масок

проведение дезинфекционных
мероприятий

этиотропная терапия

15.
К мерам
неспецифической
профилактики
не относится:

соблюдение правил личной
гигиены

использование одноразовых
медицинских масок

проведение дезинфекционных
мероприятий

этиотропная терапия

**Спасибо за Ваши
ответы!**